









पोटुस्या या लक्षणांचा समावेश असू शकता. सामान्यतः लगाण झाल्यापासून लक्षणे दिसण्यापर्यंतचा कालावधी हा दोन ते तीन दिवसांचा असू शकता.

बहुतेक प्रकरणामध्ये सौम्य लक्षणे आढऱ्यात, तर काही रोगामध्ये क्वायल न्युमोनिया आणि बहु-अववाव निकमी हाण्याची भीती असते. १२ एप्रिल २०२५पर्यंत जगातील १४५ देशांतील १३,५८,६९,७०४ पेक्षा जास्त लोकांना हा रोग झाला असल्याची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

परिणामी २९,३५,२७१ पेक्षा जास्त लोक मणे पावले आहेत, त्यात माझीही पती ६ एप्रिल २०२० रोजी जगाचा नियंत्रण घेऊन मला सोडून गेली. ७,७२,८४,५६६ पेक्षा जास्त लोक बरेही झाले आहेत. एकूण संख्या झालेल्या रोगांपैकी दोन टक्के लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या कोरोना काळात हाताकार माजला होता.

हातावर पोट असण्यांची पुरी धांदल उडाली होती. महणून कोरोनातील परिस्थिती आठवली नव्हे नव्हे, केवळ कोरोना शब्द काणी पडला तरी अपलाला रुख कोसळते. डोळ्यादेखाव प्रियजाणांना मरताना पाहून जीव कल्वळत होता, धासीतीन जीव गुदमणे होते. ती परिस्थिती शब्दात माडणे अशक्यच !

महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणू उडेकातील पहिल्या रुग्णांनी नोंद १ मार्च २०२० रोजी पुण्यात झाली होती. हा विषाणू प्रामुख्याने जवळच्या सपकादरम्यान खोकल्यामुळे, शिंगण्यामुळे किंवा बोलताना नकल्या बाबर पडण्याचा थुंकीच्या तुषारांमुळे लोकांपाये पसरतो.

हे थेव अथवा तुषार शवासोच्छवासाच्या दरमानदेखील बाबर पडून अज्ञाबाजूच्या जिमीनीवर किंवा पृथग्यांवर पडतात व अशा द्रुतित पुष्टागाला हाताने स्पॅन करून आणि नंतर तोच त्यांच्या चेहऱ्याला या आजाराचा सामान्य लक्षणांमध्ये ताप, खोकला आणि शवास लागण याचा समावेश अहे, तर इतर लक्षणांमध्ये थकवा, स्नायू दुखणे, अतिसार, घसा खवखवणे, गंध कमी होणे आणि असू नंतर तोच त्यांच्या चेहऱ्याला



लावल्यानेही लोक संक्रमित होऊ शकतात. हे विषाणू ७२ तासांपर्यंत या दूरीपूर्वीभागावर जिवंत राहू शकतात.

लक्षणे दिसल्यानंतरच्या पाहिल्या तीन दिवसात ही विषाणू सर्वात जास्त संक्रमक असतो, परंतु रोगाची लक्षणे दिसण्यावरूपी देखिल आणि रोगाच्या नंतरच्या टप्पात देखील फार संक्रमक असतो. या रोगाच्या निदानाची मानक पद्धत महणजे नाकातून घेतलेल्या नमुन्यांची रीअल-टाइम रिक्स द्रास्क्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन-अरआरटी-पॉसीआर नावाची तपासणी होय.

वारंवार सावधाने व्यवस्थित हात धुणे, इतरांशी शारीरिक अंतर राखणे, विशेषतः लक्षणे असण्याचा लोकांकडून खोकताना किंवा शिकताना रुमालाचा वापर करणे, अचानक शिंग आली असताना व रुमाल जवळ नसल्यास कोप पेंडोवर धूरून विलीकरण व काणी प्रयोगात्मक उपाय सांगतात. याचा उपचार म्हणून वापर केला जातो. हाताच्या आतल्या बाजूला शिकणे, न धुतलेले हात चेहऱ्यापासून दूर ठेवणे या जागतिक अरोग्य संघटनेने हा कोविड-१९चा उद्देशक हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय असल्याचे सांगत या उद्काळाला जागतिक महामारी जाहीर केले गेले.

सध्या, कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ वर असेही २२९५ अल्पकांगने कोरोनाव्हायरस कोरोनाचा वापर केला जातो. दोन टक्के खोकला, शिंग केला जातो. तेव्हा न केल्यास कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणू हवेतून १५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रारंभिक अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरस रोग २०१९- कोविड-१९ विषाणूच्या तुप्पेतून ५ फुटपर्यंत लांब पसरू शकतात.

हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात किंवा नाकात शिरतात आहे. फुफ्फुसामध्ये पोहे चतात, प्रार







